♀. Tarses antérieurs et intermédiaires simples, ongles de ces tarses égaux, simples. Segment anal faiblement strigueux.

Nombreux exemplaires capturés au Kilimandjaro, entre 2.600 et 2.700 m. d'altitude. dans la zone alpine des forêts supérieures, en octobre 1908, par notre confrère M. Ch. ALLUAUD, à qui je me fais un plaisir de dédier cette espèce.

Du groupe des espèces de montagnes à élytres allongés ; voisin notamment des *Rhantus advena* Sharp, *R. remator* Sharp et *R. vicinus* Aubé (Cordillères des Andes, Équateur, Pérou, Bolivie, 2.100 à 2.850 m. d'altitude), il s'en distinguera très facilement pas sa forme générale bien plus parallèle, plus allongée et relativement étroite, encore accentuée par le faible rétrécissement du thorax et la grande largeur de la tête qui donne au *R. Alluaudi* un facies analogue à celui des *Lancetes* américains, notamment des *L. homoenyx* Régimb. et L. *nigriceps* Er.

Hétéromères nouveaux du groupe des *Zonitini* [COL. HETEROMERA]

par Maurice PIC.

Zonitis japonica, n. sp. — *Satis elongata, subparallela, subnitida, griseo-pubescens, testacea, oculis, palpis, antennis, articulo primo excepto testaceo, tibiis tarsisque nigris.*

Assez allongé, subparallèle, peu brillant, pubescent de gris, testacé avec les yeux, palpes, antennes, sauf le 1er article qui est testacé, tibias et tarses noirs, abdomen en partie roussâtre en partie rembruni. Tête courte, fortement et densément ponctuée; antennes longues et grêles. noires avec le premier article testacé; prothorax assez long. rétréci en avant, impressionné sur le disque, à ponctuation forte et plus ou moins rapprochée; écusson fortement ponctué; élytres distinctement plus larges que le prothorax, longs, faiblement élargis postérieurement, très densément ponctués, ornés de côtes faibles; dessous du corps testacé avec l'abdomen plus ou moins roussâtre; pattes noires avec les cuisses testacées. — Long. 16 mill.

Japon : Kioto (coll. Pic).

Voisin de *Z. straminea* Fairm.; facile à reconnaître, à première vue, par le 2e article des antennes foncé, la coloration des pattes. etc.

Zonitis sikkimensis, n. sp. — *Elongata, subparallela, subnitida, griseo-pubescens, rufo-testacea, capite, palpis, antennis pedibusque pro parte nigris, elytris testaceis apice, nigro maculatis.*

Allongé, subparallèle, un peu brillant, pubescent de gris, roux-testacé avec la tête, les palpes et les antennes noires, pattes bicolores, élytres testacés avec une macule apicale noire. Tête courte, fortement et densément ponctuée; prothorax roux-testacé, plus étroit que la tête, long, rétréci antérieurement, impressionné sur le milieu du disque en arrière et transversalement en avant, marqué d'une ponctuation forte, peu rapprochée; écusson roux-testacé, fortement ponctué; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, finement, densément et subruguleusement ponctués avec de vagues traces de côtes, testacés mais ornés d'une petite macule apicale noire; dessous du corps roux, parfois en partie obscurci sur l'abdomen; pattes noires avec les cuisses largement rousses à la base. — Long. 13-14 mill.

Indes : Sikkim (coll. Pic). Reçu de Bang-Haas.

Voisin de Z. *melanarthra* Fairm.; s'en distingue facilement par l'avant-corps plus étroit et la tête noire.

Zonitomorpha Lemoulti, n. sp. — *Oblonga, antice attenuata, postice parum dilatata, nitida, rufo-testacea, oculis nigris, antennis pedibusque pro parte nigris, pro parte testaceis.*

Oblong, atténué en avant, un peu élargi en arrière, brillant, roux-testacé avec les yeux noirs, antennes noires sauf les deux premiers articles qui sont roussâtres, celles-ci un peu épaissies; pattes robustes, testacées avec le sommet des cuisses, l'extrémité des tibias plus ou moins, enfin les tarses noirs; dessous du corps roux-testacé, un peu obscurci entre les hanches intermédiaires et postérieures. Tête longue, à ponctuation forte et espacée; prothorax étroit et long, un peu rétréci en avant, à ponctuation forte et plus ou moins écartée avec un faible sillon médian postérieur; élytres larges, distinctement élargis en dessous du milieu, peu longs, densément et subruguleusement ponctués avec des traces de côtes faibles. — Long. : 14 mill.

Afrique Orientale allemande : Lindi (coll. Pic).

Peut se placer près de Z. *transgressor* Péring., dont il se distingue par la forme du corps élargie postérieurement, la coloration du dessous du corps et des pattes.

Dédié à notre collègue Le Moult qui me l'a procuré.